

Help Your Pet Heal

for the next 7–10 days!

No Licking!



Licking or chewing at the incision can cause infection.

Check The Incision

What you see today is normal. Check twice a day for redness, swelling, or discharge.

The small, green tattoo indicates spayed or neutered.



Keep It Dry

Water affects surgical glue & opens the incision, causing infection.



Separate Animals



Keep females away from un-neutered males.

Incisions on Males are Left Open



It is normal to see swelling & red discharge for a few days during the healing process.

Restrict Activity



Inside rest for the next 10 days.

Short leash walks only, to urinate and defecate. No running, jumping or roughhousing.

Feed a Simple Diet

Do not give your pet junk food, special treats, table scraps, or milk.



No Human Medication!



It is dangerous & can be fatal! Your pet has already received long-acting pain medication.

If your pet received a vaccine at our clinic, please discuss a booster vaccine with your regular veterinarian. Canine distemper/parvo vaccines and feline distemper vaccine all need to be boosted three to four weeks after administration of the first vaccine for maximum effectiveness. Rabies vaccines are boosted yearly.

If the above post-operative instructions are followed in full, we will make every reasonable effort to treat any post-operative complications resulting directly from surgery at Asheville Humane Society. Your regular veterinarian must address illnesses or injuries that are not a direct result of surgery.

During business hours (Monday–Friday, 8 a.m.–5 p.m.) please call for an appointment as soon as you see any cause for concern at (828) 777-6339. After office hours, please call your regular veterinarian or MedVet Asheville, open 24/7, at (828) 665-4399.

Ayude a sanar a su mascota

¡Durante los próximos 7-10 días!

¡Sin lamer!



Lamer o masticar la incisión puede provocar una infección.

Revisa la incisión

Lo que ves hoy es normal. Verifique dos veces al día para ver si hay enrojecimiento, hinchazón o secreción.



El pequeño tatuaje verde indica esterilizado o castrado.

Manten el area seca

El agua afecta el pegamento quirúrgico y abre la incisión, provocando infección.



Separa tus Mascotas

Mantenga a las hembras alejadas de los machos no castrados.

Las incisiones en los machos se dejan abiertas



Es normal ver hinchazón y secreción roja durante algunos días durante el proceso de curación.

Restringir actividad



Descanso interior durante los próximos 10 días.

Paseos cortos con correa únicamente para orinar y defecar. No correr, saltar o Juego brusco.

Mantegale una dieta simple

No le dé a su mascota comida chatarra, golosinas especiales, sobras de la mesa, ni leche.



¡Sin medicación humana!



¡Es peligroso y puede ser fatal! Su mascota ya recibió analgésicos de acción prolongada.

Si su mascota recibió una vacuna en nuestra clínica, hable sobre una vacuna de refuerzo con su veterinario habitual. Las vacunas contra el moquillo canino/parvo y la vacuna contra el moquillo felino deben reforzarse tres o cuatro semanas después de la administración de la primera vacuna para obtener la máxima eficacia. Las vacunas contra la rabia se refuerzan anualmente.

Si se siguen en su totalidad las instrucciones postoperatorias anteriores, haremos todos los esfuerzos razonables para tratar cualquier complicación postoperatoria que resulte directamente de la cirugía en la Unidad Médica de AHS. Su veterinario habitual debe abordar enfermedades o lesiones que no sean resultado directo de la cirugía.

Durante el horario comercial de 8 a. m.-5 p. m., de lunes a viernes, llame para programar una cita tan pronto como vea algún motivo de preocupación al (828) 777-6339. Después del horario de oficina, llame a su veterinario habitual o a MedVet Asheville, abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, su número de teléfono es (828) 665-4399.